GEFTA-Fortbildungskurs „Praxis der Untersuchung von Phasenübergängen“
Ansbach, 30./31.10.2001

Phasendiagramme von Enantiomeren

Dr. Steffen Neuenfeld, Zentrale Verfahrensentwicklung

Racematmodifikationen

Racemische Verbindung
(echtes Racemat)

RSRSRSRS
RSRSRSRS
RSRSRSRS
RSRSRSRS
RSRSRSRS

Racemische Mischung
(Konglomerat)

RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR
RRRRRRR

Pseudoracemat

RRSSRRR
SRRRRSS
RRRRRSR
RSSSRRR
RSRSRRS

Phasengleichgewichte zwischen Ephedrine HCl-Enantiomeren und Diastereomeren

(1R,2S)-(-)-

(1S,2R)-(+)-

(1S,2S)-(+)-

(1R,2R)-(-)-

Ephedrine (*erythro*)

Pseudoephedrine (*threo*)

Quelle: Prankerd, R.J.P.; Elsabee, M.Z.: *Thermochim. Acta* 248 (1995) 147-160

Phasengleichgewichte zwischen Ephedrine HCl-Enantiomeren und Diastereomeren

Anpassung: Schröder-van Laar-Gleichung (1)

Prigogine-Defay-Gleichung (2)

$$\ln x_1 = \frac{\Delta_{fus} H_A}{R} \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T} \right)$$

$$\ln 4x_1(1-x_1) = \frac{2\Delta_{fus} H_R}{R} \left(\frac{1}{T_R} - \frac{1}{T} \right)$$

Quelle: Prankerd, R.J.P.; Elsabee, M.Z.: *Thermochim. Acta* 248 (1995) 147-160

Phasengleichgewichte zwischen Enantiomeren von MOHIC-Salzen

MOHIC-Base

1-(4-Methoxy-benzyl)-1,2,3,4,5,6,7,
8-octahydro-isoquinoline

Maleat - Racemische Verbindung

Fp. (Enantiomer) 137°C

Fp. (Racemat) 134°C

Fp. (Eutektikum) 124°C

Acetat - Konglomerat

Fp. (Enantiomer) 89°C

Fp. (Konglomerat) 72°C

Hydrochlorid und Benzoat

Umwandlung von Konglomerat zu
racemischer Verbindung während
der DSC-Messung

Quelle: interner Merck-Report 1984

Polymorphie bei Racematen

Beispiel - EMD 96717

Phasendiagramm

A - Enantiomere - Fp. 177°C

B - Racemische Verbindung - Fp. 189°C

C - Racemisches Konglomerat - Fp. 175°C

IR-Spektrum und XRD für A und C gleich

Löslichkeit $B < C$

Freie Enthalpie für Bildung aus Enantiomeren

$$\Delta_{\text{R}}G (\text{B}) = -3.8 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_{\text{R}}G (\text{C}) = 0$$

Polymorphie bei Racematen

Beispiel - (R)- und (S)-Nitrendipine

DSC-Messungen

3 Racematformen
 2 polymorphe Enantiomere
 + ein weitere vorausgesagt

Quelle: Burger, A.; Rollinger, J.M.; Brüggeller, P.: *J. Pharm. Sci.* 86 (1997) 674-679

Bestimmung der Enantiomerenreinheit

2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-propane-1,3-diol

Phasendiagramm = Konglomerattyp

Enantiomer	Fp. 164.8°C	$\Delta_f H = 46.22 \text{ kJ/mol}$
Konglomerat	Fp. 141.9°C	$\Delta_f H = 42.56 \text{ kJ/mol}$

Fig. 2: Melting point phase diagram a of 2 in the molecular ratio 0.5 - 1.0 calculated by Schröder-Van Laar⁷⁾ equation with experimental points (*) obtained by DSC heating curves b.

Quelle: Pitre, D.; Nebuloni, M.; Ferri, V.: Arch. Pharm. (Weinheim) 324 (1991) 325-328

Bestimmung der Enantiomerenreinheit

Fig. 3: Melting point phase diagram a of 2 in the molecular ratio 0.94 - 1 calculated by Schröder-Van Laar⁷⁾ equation with experimental points (*) obtained by DSC heating curves b.

Enantiomerenreinheit

Kalibrierkurve zwischen
Reinheit 95 % und 100 %

Vergleich

Fp. (°C)	Enantiomerenreinheit (%)	Enantiomerenreinheit (%)	
		gemessen	berechnet
163.10	163.0	97.45	97.47
163.61	163.5	98.62	98.65
164.16	164.1	99.01	99.08
164.44	165.3	99.41	99.49
164.61	164.4	99.66	99.45

Quelle: Pitre, D.; Nebuloni, M.; Ferri, V.: Arch. Pharm. (Weinheim) 324 (1991) 325-328